

Bērnu vakcinācijas kalendārs

0-12 stundas	2-5 dienas	2 mēneši	3 mēneši	4 mēneši	6 mēneši	12-15 mēneši	7 gadi	12 gadi	14 gadi	ik 10 gadus
B hepatīts ¹	Tuberkuloze	(kombinētā vakcīna) Difterija, Stinguma krampji, Garais klepus, Poliomielīts, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija, B hepatīts	(2. pote) Rotavīrusu infekcija	(kombinētā vakcīna) Difterija, Stinguma krampji, Garais klepus, Poliomielīts, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija, B hepatīts	(kombinētā vakcīna) Difterija, Stinguma krampji, Garais klepus, Poliomielīts, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija, B hepatīts	(kombinētā vakcīna) Difterija, Stinguma krampji, Garais klepus, Poliomielīts, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija, B hepatīts	(kombinētā vakcīna) Difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomielīts	(tikai meitenēm) Cilvēka papilomas vīrusa infekcija ³	(kombinētā vakcīna) Difterija, stinguma krampji, poliomielīts	(kombinētā vakcīna) Difterija, stinguma krampji
		Pneimokoku infekcija		Pneimokoku infekcija			(kombinētā vakcīna) Masalas, epidēmiskais parotīts, masaliņas	(tikai meitenēm) Masaliņas ²	B hepatīts ⁴	
		(1. pote) Rotavīrusu infekcija								



Vakcinācijas kalendārs ir viegli lietojams - atrodi bērna vecumu un uzzini, pret kuru infekcijas slimību, atbilstošajā vecumā, bērns obligāti jāvakcinē, lai novērstu smagas un nāvējošas saslimšanas.

Nevakcinētam bērnam apmeklējot skolu vai bērnudārzu, palielinās inficēšanās risks gan pašam nevakcinētajam bērnam, gan apkārtējiem.

!!! Vakcinācija pret rotavīrusu infekciju iekļauta vakcinācijas kalendārā kopš 2015.gada janvāra.

Atbilstošajā vecumā paredzētās potes ir iespējams veikt vienlaicīgi un tas nemazina to iedarbību.

Uz visiem neskaidriem jautājumiem par bērnu vakcināciju atbildēs ģimenes ārsts.

Valsts apmaksātā jeb obligātā vakcinācija ietverta Vakcinācijas kalendārā - tā pienākas ikvienam bērnam, arī tad, ja viņš nav bijis vakcinēts savlaicīgi (medicīnisku vai citu iemeslu dēļ). Nokavējot noteikto vakcīnas ievadīšanas vecumu, ievadīt papildus devu nav nepieciešams. Ar ģimenes ārstu jāvienojas par turpmāko vakcinācijas grafiku.

!!! 2. poti pret rotavīrusu infekciju var veikt 3 vai 4 mēn. vecumā.

Ja vakcināciju pret rotavīrusu infekciju nav iespējams uzsākt 2 mēnešu vecumā, ārsts var piemērot individuālu vakcinācijas shēmu:

- 1) pirmo vakcīnas devu var ievadīt, sākot no 6 nedēļu vecuma;
- 2) intervālam starp abām vakcinācijas reizēm jābūt vismaz 4 nedēļām;
- 3) vakcinācijas kurss (2 vakcinācijas reizes) jāpabeidz pirms 24 nedēļu vecuma.

Atceries! Vakcinācija ir labākais un efektīvākais veids, kā bērnu pasargāt no bīstamām un nāvējošām infekcijas slimībām!



¹ **B hepatīts pirmajās 0-12 dzīves stundās:** Vakcīnu pret B hepatītu ievada tikai riska grupas jaundzimušajiem (bērniem, kuri dzimuši B hepatīta virsmas antigēna (HBsAg) pozitīvām mātēm vai mātēm, kuras nebija pārbaudītas HBsAg klātbūtnes noteikšanai).

² **Masaliņas 12 gados:** Pret masaliņām vakcinē nevakcinētas vai nerevakcinētas meitenes, izņemot tās, kuras pārslimojušas masaliņas un kurām diagnoze "masaliņas" apstiprināta seroloģiski. Vakcinācijai un revakcinācijai izmanto kombinēto MPR vakcīnu.

³ **Cilvēka papilomas vīrusa infekcija 12 gados:** vakcinācija sastāv no divām potēm, kuras ievada atbilstoši zāļu lietošanas instrukcijai.

⁴ **B hepatīts 14 gados:** Vakcinē tikai agrāk nevakcinētos bērnus.



Slimību profilakses un kontroles centrs