



Slimību profilakses un  
kontroles centrs

**Vakcinācijas kalendārs**

(Pielikums MK 26.05.2009. noteikumu Nr.487 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1103; MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.124; MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.446; pielikuma 3., 4., 5. un 7.punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Nr. p.k.	Vakcinējamās personas vecums	Infekcijas slimība, pret kuru obligāti veicama vakcinācija	Vakcīnu nosaukumu apzīmējumi	Piezīmes
1.	0–12 stundas	B hepatīts	HB	Vakcīnu pret B hepatītu ievada tikai riska grupas jaundzimušajiem (dzimuši B hepatīta virsmas antigēna (HBsAg) pozitīvām mātēm vai mātēm, kuras nebija pārbaudītas HBsAg klātbūtnes noteikšanai). Vakcīnas devas ievada atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai
2.	2–5 dienas	Tuberkuloze	BCG	–
3.	2 mēneši	Difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomiēlīts, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija un B hepatīts	DTaP – IPV-Hib-HB1	Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu komponentu), poliomiēlītu, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekciju un B hepatītu.  Bērņus, kuriem kontraindicēta vakcīna pret garo klepu, vakcinē ar vakcīnu pret difteriju un stinguma krampjiem (DT) un vakcīnu pret poliomiēlītu (IPV)
		Pneimokoku infekcija	PCV1	
		Rotavīrusu infekcija	RV1	
4.	4 mēneši	Difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomiēlīts, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija un B hepatīts	DTaP – IPV-Hib-HB2	Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu komponentu), poliomiēlītu, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekciju un B hepatītu.  Bērņus, kuriem kontraindicēta vakcīna pret garo klepu, vakcinē ar vakcīnu pret difteriju un stinguma krampjiem (DT) un vakcīnu pret poliomiēlītu (IPV)
		Pneimokoku infekcija	PCV2	
		Rotavīrusu infekcija	RV2	
5.	6 mēneši	Difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomiēlīts, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija un B hepatīts	DTaP – IPV-Hib-HB3	Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu komponentu), poliomiēlītu, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekciju un B hepatītu.  Bērņus, kuriem kontraindicēta vakcīna pret garo klepu, vakcinē ar vakcīnu pret difteriju un stinguma krampjiem (DT) un vakcīnu pret poliomiēlītu (IPV)
		Rotavīrusu infekcija	RV3	Ja zāļu lietošanas instrukcija paredz vakcīnas pret rotavīrusu infekciju trešo devu
6.	12–15 mēneši	Difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomiēlīts, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija un B hepatīts	DTaP- IPV-Hib-HB4	Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu komponentu), poliomiēlītu, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekciju un B hepatītu.  Bērņus, kuriem kontraindicēta vakcīna pret garo klepu, vakcinē ar vakcīnu pret difteriju un stinguma krampjiem (DT) un vakcīnu pret poliomiēlītu (IPV)
		Pneimokoku infekcija	PCV3	–
		Masalas, epidēmiskais parotīts, masaliņas	MPR1	Lieto kombinēto vakcīnu pret masalām, epidēmisko parotītu un masaliņām, iespējams lietot arī kombinēto vakcīnu pret masalām, epidēmisko parotītu, masaliņām un vējbakām
		Vējbakas	Varicella1	
7.	7 gadi	Difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomiēlīts	DTaP-IPV5	Lieto kombinēto vakcīnu ar garā klepus bezšūnu komponentu.  Bērņus, kuriem kontraindicēta vakcīna pret garo klepu, vakcinē ar vakcīnu pret difteriju un stinguma krampjiem (DT) un vakcīnu pret poliomiēlītu (IPV).  Vakcinēt pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu un poliomiēlītu drīkst sešus gadus vecus bērnus, ja bērns uzsāk mācības izglītības iestādē
		Masalas, epidēmiskais parotīts, masaliņas	MPR2	Pret masalām, epidēmisko parotītu un masaliņām vakcinē tikai bērnus, kuri saņēmuši tikai vienu MPR vakcīnas devu.  Vakcinēt pret masalām, epidēmisko parotītu un masaliņām drīkst sešus gadus vecus bērnus, ja bērns uzsāk mācības izglītības iestādē
		Vējbakas	Varicella2	Pret vējbakām vakcinē bērnus, kuri saņēmuši vakcīnas pret vējbakām pirmo devu un kuri nav pārslimojuši vējbakas.  Vakcinēt pret vējbakām drīkst sešus gadus vecus bērnus, ja bērns uzsāk mācības izglītības iestādē
		Masalas, epidēmiskais parotīts, masaliņas	MPR1 vai MPR2	Pret masaliņām vakcinē nevakcinētas vai nerevakcinētas meitenes, izņemot tās, kuras pārslimojušas masaliņas un kurām diagnoze “masaliņas” apstiprināta seroloģiski. Vakcinācijai un revakcinācijai izmanto kombinēto MPR vakcīnu
8.	12 gadi (meitenes)	Cilvēka papilomas vīrusa infekcija	CPV1, CPV2, CPV3	Vakcinējot pret cilvēka papilomas vīrusa infekciju, ievada trīs vakcīnas devas atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai
		Difterija, stinguma krampji, poliomiēlīts	Td -IPV 6	Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stinguma krampjiem un poliomiēlītu
9.	14 gadi	B hepatīts	HB 1, HB 2, HB 3	Vakcinē tikai pret B hepatītu agrāk nevakcinētos bērnus. Vakcinējot pret B hepatītu, ievada trīs vakcīnas devas atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai
		Difterija un stinguma krampji	Td	Lieto vakcīnu pret stinguma krampjiem un difteriju ar samazinātu difterijas toksoīda daudzumu (Td)